



Mer info på: [www.agortus.com](http://www.agortus.com)



- Sort:** CONDOR
- Fördelar:** Senblommande,  
Långa rötter som bygger kanaler,  
Mycket god ogräs-konkurrens
- Användning:** Trädesgröda,  
ej nematodsanerande



CONDOR

### Resultat 1998-2003

Sort	Nematodklass	Marktäckning	Blomning	Plantlängd (100 = 99 cm)	Liggbildning	Alternaria resistens
Concerta	2	8,5	7,5	109	5,5	7,0
Architect	2	7,5	8,5	99	6,5	7,0
Rivona	2	7,5	8,0	102	7,0	7,0
Condor	<b>Ej resistent</b>	<b>8,0</b>	<b>7,5</b>	<b>100</b>	<b>6,5</b>	<b>7,5</b>
Ultra	2	8,0	7,0	103	5,5	7,0
Metex	2	8,0	6,5	103	6,0	7,0
Emergo	2	7,0	6,0	103	5,5	7,0
Abraham	2	7,5	8,0	94	7,0	6,5
Zembla	2	7,0	8,5	95	5,0	7,5
Accent	1	7,5	9,0	106	6,0	7,0
Achat	2	8,0	8,0	104	6,0	7,0

Källa: Nederländska sortlistan & resultat från Joordens Zaden 2004  
Skalan i tabellen ovan, kolumn 3,4,6,7: 1 = dålig & 9 = bra/god/hög

### Fördelar

**CONDOR är en relativt senblommande sort. CONDOR täcker marken mycket snabbt.**  
**Liggbildningsresistensen är medel. CONDOR har av sorterna bäst Alternaria resistens.**



Mer info på: [www.agortus.com](http://www.agortus.com)



## Effekter av oljerättika resp vitsenap i färskpotatisväxtföljd!

### Fördelarna mot tex. gräsinsådd är:

- Bättre Rhizoctonia(groddbränna) kontroll genom:
  - ett betydligt kraftigare och djupare rotsystem med pårötter sker en påverkan på markprofilen som
  - resulterar i sämre miljöför groddbrännesvampen (Rhizoctonia)
- Betydligt djupare rotsystem:
  - Bättre kväve (N) upptag
  - Ytskiktsdränering:
- sämre miljöför svampar,
- snabbare sättning på våren!
  - Minskat problem med kvickroten och gräs som spillplanter.
  - Inga grästuvor i upptagningen
  - Bearbetning av ”plogsulan”
- Enligt Holländska observationer -minskade problem med skorv och
- Sämre miljöför knäppare och andra insekter (se vidare på ”bio-fumigation” konceptet).

## Rekommendationer:

**Utsäde:** vid ej nematoder: 15 kg/ha. Om bredspritt: öka ca 10-20%

**Såtidpunkt:** snart efter huvudgrödan.

**N-gödning:** om sådd som fånggröda: ingen N. Om sådd som sanerande gröda: rekommenderas kring 30-60 kg N/ha.

**Blomning:** både rättika och senap slås av efter blomning, senast vid gröna frön för att undvika spillplanter.

Senapen har ingen återväxt, rättikan har en mycket god återväxt. Hugg höjd –10-20 cm.

CONDOR